

Pregunta para

Transferir a la terapia de bomba de infusión continua

Flotaciones y discinesia en la enfermedad de Parkinson

La progresión de la pd generalmente se asocia con complicaciones motoras potencialmente desactivadoras (como fluctuaciones motoras y discinesia) y síntomas no motores, con una ventana de tratamiento reducida, lo que limita aún más la eficacia de la terapia oral.

El manejo de los síntomas, especialmente las fluctuaciones motoras, la discinesia y el tiempo "apagado", y los síntomas no motorizados pueden requerir la optimización de la terapia oral, incluida la polifarmacia, la fraccionamiento de dosis y la reducción de la dosis) o el uso de terapias avanzadas. (Antonini y otros, 2018)

Flotaciones y discinesia :

- Incluyendo el tiempo de "apagado" (el período de regreso de los síntomas de pd cuando el efecto del medicamento se desaparece) y la discinesia.
- La discinesia es un movimiento involuntario, incluida la corea y la distonia (y la atetosis o el mioclón con movimientos lentos o conmociones musculares).
- Las complicaciones pueden experimentarse en síntomas motorizados y no motorizados.

Limitaciones clínica de los medicamentos orales y terapéuticos:


- dosis orales intermitentes de levodopa induce una estimulación discontinua de los receptores de dopamina stri-natal.
- La resistencia a los medicamentos dopaminérgicos y/o la administración oral conduce a una discapacidad dominada por síntomas motores y no motores que pueden estar presentes.
- Cuando los medicamentos orales no pueden proporcionar una estimulación dopaminérgica más continua, se puede considerar una terapia basada en dispositivos.

Ayuda para el tiempo


Gección oportuna



and/or



and/or



Usa el botón

Dacepton®
Clorhidrato de pramipexol

Preguntas sobre fluctuaciones y discinesia en la enfermedad de Parkinson para el hcp

Las siguientes preguntas están destinadas a ayudarlo a tomar decisiones sobre el control de los síntomas en las personas con enfermedad de Parkinson (PD) e identificar la necesidad de ajustar temprano el tratamiento. Es una herramienta para mejorar la calidad de la atención y el resultado del paciente. (La pregunta se deriva de la Outco-me de consenso de Antonini y otros, 2018)

Preguntas sobre el efecto de la medicación oral

Por favor marque la casilla en la línea apropiada que describa mejor su condición. Las garrapatas en la zona gris son criterios para considerar la terapia asistida por dispositivos. Esto ayudará a discutir nuevas estrategias de tratamiento.

	¿Cuántas dosis de levodopa oral tomas por día?	1-2 ☐	3-4 ☐	5 o más ☐
	¿Estás experimentando más de 2 horas en "apagado"?		no, no ☐	Sí, sí ☐
	¿Experimentas una hora de discinesia molesta por día?		no, no ☐	Sí, sí ☐
	¿Cuán molesto es tu tiempo "libre" por día?		Moderado y leve ☐	Grave ☐
	¿Estás actualmente limitado a realizar una o más actividades de la vida diaria (como vestirse, cepillar, comer, etc.)?		no, no ☐	Sí, sí ☐

www.d-minecare.com

Otras complicaciones que pueden dar una visión de la condición del paciente:

Detoci ón de la atiddes de ida día (ADL), como dcha , eddo , preparai ón de comida , el ébno , la -lng , et .

☐ Todo independiente
Actividades

☐ Necesita asistencia en algunos casos
Actividades

☐ Dependiente en
La mayoría de las
actividades

Símbma no mobres

☐ Dormir
disturbano-ces

☐ Dolor

☐ Diarrea
depres
iva

☐ Ansiedad/miedo

Símbma gálicos /uinaios

☐ Disfagia

☐ Estreñimiento

☐

☐ INCONTENCIA

Apectbs dicionles

☐ Impredicable
"Apaga"

☐ 2 o más caídas/
Mes.

☐ Dolor diario
Distonia muscular

☐ Efectos secundarios
neuropsiquiátricos

☐ Preferencia a los alimentos
que contienen teína

☐ El paciente tiene red
Trabajo

☐ El paciente entiende la
opción de asistir al dispositivo

☐ El paciente
está motivado